

Nouvelles observations de la Cistude *Emys orbicularis* L. au Maroc (Chelonia, Emydidae)

Deux Tortues aquatiques de la famille des *Emydidae* existent au Maroc

- *Mauremys caspica* Gmelin (= *Clemmys caspica leprosa* Schweigger) :

la "Tortue lépreuse";

- *Emys orbicularis* L. : la Cistude.

Si la première est extrêmement commune, la seconde paraît beaucoup plus rare et localisée. Les données actuelles sont les suivantes :

- basse vallée du Loukkos : 1 individu à l'Oued N'Khol (1926);

1 ind. à Lixus dans des mares (1970);

- Moyen Atlas : 1 ind. à l'Oued Ifrane (1926);

- Gharb : de nombreux ind. dans 6 stations différentes, entre la région de Sidi Bettache et celle de Moulay Bouselham (1954 à 1957).

Pour plus de détails, consulter : DOLLFUS (1929), PASTEUR & BONS (1957) et STEMLER (1972).

J'ai pu observer la Cistude dans 2 nouvelles stations qui étendent quelque peu son aire de répartition :

- 20 mars 1983 : 1 ind. seul dans une mare de quelques dizaines de m² alimentée par le ruissellement, au Jbel Khizana, au bord de la piste de Bab Taza à Fifi (4 km de Bab Taza, alt. env. 1100 m)

- 5 juin 1983 : 1 ind. parmi de nombreuses *Mauremys*, au lac de barrage d'Ouezzane (alt. env. 250 m).

La localité d'Ouezzane fait le lien entre la région du Gharb-Bab Loukkos et le Rif. Il serait intéressant de savoir si l'aire est continue jusqu'au Moyen Atlas.

Références bibliographiques

DOLLFUS, R. Ph. (1929). - Notules herpétologiques marocaines. *Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc*, 9, 7-8 : 112.

PASTEUR, G. & BONS, J. (1957). - Sur l'Herpétofaune marocaine (Leptotyphlopides, Colubrinés, Emydinés). *Bull. Soc. Sc. Nat. Phys. Maroc*, 37, 2 : 137-143.

STEMMLER, O. (1972). - Bericht über eine zweite herpetologische Sammelreise nach Marokko im Juli und August 1970. *Monit. Zool. Italiano*, N.S. Suppl. 4, 6 : 123-158.

JACQUEMIN G.
E.N.S. Souissi, BP. 773
RABAT-Agdal (MAROC)