

## NOTES FAUNISTIQUES MAROCAINES

### 1. UNE CAPTURE DE *THEA THURIFERAE* Sicard, 1923, AU MAROC

( Coléoptère, Coccinellidae )

Le 27 septembre 1977 une mission écologique dans le Moyen-Atlas m'a permis de récolter deux exemplaires de Coléoptères appartenant à une espèce de *Coccinellidae* qui, à l'étude, s'est révélée particulièrement intéressante. Il s'agit en effet de *Thea thuriferae* qui, à ma connaissance, est nouvelle pour le Maroc.

*Thea thuriferae* est décrite par SICARD (1923) d'après des exemplaires trouvés par P. de PEYERIMHOFF à Sgag, dans l'Aurès (Algérie) sur *Juniperus thurifera* L. Un paratype de l'espèce déposé dans la collection PEYERIMHOFF au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris m'a permis de vérifier l'identité de mes exemplaires<sup>(1)</sup>.

Dans le *Genera Coleopterorum* (1931), *T. thuriferae* est signalé, outre l'Algérie, de l'ouest et du sud de l'Espagne. H. WAGNER (1926) parle, pour l'Espagne, de récolte de l'espèce " sur deux très vieux *Juniperus* ". Il peut s'agir de genévriers thurifères d'âge respectable. La station de récolte serait une pelouse ("Wiesengelände") proche de Teruel.

Cette coccinelle n'est pas citée par KOCHER dans son catalogue (1956) et elle n'est pas représentée dans la collection de l'Institut Scientifique de Rabat<sup>(2)</sup>.

J'ai récolté deux exemplaires de *T. thuriferae* au voisinage de l'Oued Arbi, modeste affluent du cours supérieur de l'Oued Guigou, très exactement le long de la piste qui mène de la route Timahdite-Midelt (P. 21) à la Station Forestière proche de Aïn Arbi. Les individus sont tombés pendant un

---

(1) Je remercie vivement M.R. DAJOZ qui a bien voulu me guider dans la consultation de la collection du Museum de Paris.

(2) Un exemplaire de *T. thuriferae* est cédé à l'Institut Scientifique pour sa collection de Coléoptères.

battage sur un vieux genévrier thurifère, passablement mutilé (nombreux rameaux coupés vers leur extrémité), poussant à même une petite paroi rocheuse à l'est de la piste (altitude 2 000 m).

*T. thuriferae* occupe l'extrême pourtour occidental du biome méditerranéen (Algérie, Maroc, Espagne); il paraît singulièrement inféodé à une espèce très précise de genévrier sur laquelle il est à rechercher; une station unique au Maroc me semble peu vraisemblable.

## REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

JUNK (W.), 1931. - Coccinellidae in : Genera Coleopterorum, pars 118 : 1-659..

KOCHER (L.), 1956. - Catalogue commenté des Coléoptères du Maroc. Trav. Inst. Sc. Rabat, Zool., 8 (3) : 1-136.

SICARD (A.), 1923. - Coccinellidés nouveaux de l'Afrique du Nord. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N., 14 (1) : 78-80.

WAGNER (A.), 1926. - Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien (Sommer 1925). Coleopt. Centralbl., 1 : 262-268.

Louis BIGOT  
Laboratoire de Biologie Animale  
(Ecologie), Faculté des Sciences  
et Techniques de Saint-Jérôme,  
rue H. Poincaré, F. 13397 Marseille  
cedex 4.