

## NOTES FAUNISTIQUES MAROCAINES

### 1. Présence de la loche de rivière dans le causse moyen-atlasique (Pisces, Cobitidae)

La plupart des récoltes de *Cobitis taenia maroccana* Pellegrin faites jusqu'à présent, proviennent de cours d'eau de plaine situés entre le Rif et le Moyen-Atlas. PELLEGRIN (1929) signale 4 localités du Gharb: O. Tiflet à Sidi Yahia et à Tiflet, Lalla Mimouna et O. Nkhol dans la région de Sidi Jmil (entre Moulay Bouselham et Larache). PERES (1939), ne connaissant probablement pas le travail de PELLEGRIN (1929), signale 5 autres localités: O. Tourizat (Gharb),; O. Beht à Sidi Slimane et près de Aïn Jorra, O. Smento et Aïn Aouaoulrif (petite source à environ 700 m d'altitude et qui aboutit à O. el Kell, région d'Agourai).

La dernière localité indiquée par PERES est la plus élevée qu'on connaissait. Au cours de récentes prospections dans les cours d'eau du Moyen-Atlas, j'ai pu capturer un individu dans l'O. Guigou à Almis du Guigou (1480)m d'altitude). Bien que cette récolte présente un intérêt pour la connaissance de l'aire de distribution et de l'amplitude altitudinale de l'espèce, elle n'apporte pas de nouveauté à son écologie; en effet, l'O. Guigou présente au niveau d'Almis, un cours lent avec un fond sablo-limoneux, ou rarement caillouteux et une végétation marginale très dense.

#### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- PELLEGRIN, J. (1929) - La loche du Maroc. Bull. Soc. Zool. France; 54: 524-26.  
PERES, J.M. (1939) - La loche de rivière au Maroc. C. R. Soc. Sci. Nat. Maroc; IV (4); séance du 18 avril; p. 24.

Mohamed DAKKI  
Insitut Scientifique Rabat.