

NOTES FAUNISTIQUES MAROCAINES

Notes sur trois Leptocérides (*Trichoptera*) du Maroc

Athripsodes cinereus Curtis et *Athripsodes taounate* Dakki et Malicky

Depuis la description d'*Athripsodes taounate* (DAKKI et MALICKY 1979) nous considérons que *Athripsodes cinereus* Curtis est absente au Maroc. Cette dernière espèce fut signalée de l'O. Guigou à Timahdite (Moyen Atlas) par MOSELY (1938) et nous l'avons retrouvée dans le même cours d'eau. Les nombreuses imagos que nous avons étudiées montraient au niveau des genitalia une certaine variabilité qui nous a poussé à les classer dans l'espèce *A. taounate*, les différences observées entre l'holotype provenant du Rif et les paratypes du Moyen Atlas furent attribuées à une variabilité géographique.

Grace à une chasse à la lumière UV, nous avons capturé le 19.6.83, dans un cours d'eau moyen-atlasique, oued Zloul, près de Ribat-Al-Khir, à 770 m d'alt. deux imagos mâle et femelle d'*A. taounate*. Les genitalia du mâle sont identiques à celles de l'holotype rifain; une comparaison de cet individu avec les exemplaires provenant de l'oued Guigou a montré des différences en particulier au niveau des segments IX et X, qui sont loin d'être dues à une simple variabilité intra-spécifique.

Nous considérons donc que les exemplaires signalés par DAKKI & MALICKY (1979) provenant de l'oued Guigou appartiennent, conformément à la citation de MOSELY (1938), plutôt à l'espèce *A. cinereus* Curtis.

Nous attribuerons à *A. taounate* Dakki et Malicky trois imagos actuellement connues : l'holotype ♂ provenant de la région de Taounate (Rif), en possession de H. MALICKY et 1 ♂ + 1 ♀ provenant de l'O. Zloul (Moyen Atlas), déposés dans les collections du Musée de l'Institut Scientifique de Rabat.

Parmi les figures présentées lors de la description originale de *A. taounate* (DAKKI & MALICKY, 1979), quatre sont faites sur des exemplaires provenant de l'oued Guigou et sont donc des figures d'*A. cinereus* : il s'agit des fig. B, D, G et du X^e segment qui accompagne les figures A et D.

Leptocerus tineiformis Curtis

Cette espèce, longement répandue en Europe centrale et occidentale, n'a pas été jusqu'à présent signalée du Maroc. Nous avons récolté récemment le 8.6.1983, dans un lac du Moyen Atlas : Dayet Aoua à 1460 m d'altitude, dans un piège lumineux à UV, 7 imagos mâles de cette espèce.

Une citation douteuse (*Leptocerus* sp. cf. *tineiformis* ?) a été faite en Algérie par GAUTHIER (1928) d'après des larves seulement.

Travaux cités

- DAKKI, M. & MALICKY, H. (1979). - Drei neue köcherfliegen (Trichoptera) aus Marokko. *Zeit. Arbeit. Ent.*, 31, 3/4 : 103-106.
- MOSELY, M.E. (1938). - Trichoptera collected in Morocco by Messers. K.H. Chapmann and G.A. Bisset. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 2, 1 : 271-277.
- GAUTHIER, H. (1928). *Recherches sur la faune des eaux continentales de l'Algérie et de la Tunisie*. Thèse, Alger.

Mohamed DAKKI
Institut Scientifique
Département de Zoologie et
Ecologie Animale
B.P. 703 RABAT-Agdal (MAROC)